

高知県沖ノ島で得られたアカシュモクザメ

水野晃秀・古屋野太一

1998年4月29日、宇和海に位置する高知県宿毛市沖ノ島古屋野（こやの）沿岸域で、アジ建網によりシュモクザメ科アカシュモクザメ *Sphyrna lewini* が3尾混獲された（写真）。本種は吻の前縁部が丸みを帯び、中央部にへこみがあること、第2背鰭基底が臀鰭基底より短いことで近縁のシロシュモクザメ *Sphyrna zygaena* と識別できる（吉野・青沼, 1993; 林, 1997）。本種は関東地方以南、世界の温帯・熱帯海域に分布し、沿岸域に生息するが、生息深度は表層付近から水深280m前後までと幅広く、湾内や汽水域にも出現する（吉野・青沼, 1993; 林, 1997）。

宇和海からは、平松（1985）が目録的に報告しているが、ここでは標本に基づく記録として紹介する。標本は、現在、国立科学博物館魚類資料（NSMT-P）として登録・保管されている。なお、個体はすべて高知県宿毛市沖ノ島の古屋野勝男氏により採集され、提供して頂いた。標

本の登録・保管には、国立科学博物館の松浦啓一博士に便宜を図っていただいた。本稿は、愛媛県中予水産試験場主任研究員の清水孝昭氏に校閲していただいた。記してここに感謝の意を表する。

引用文献

- ・林 義行. 1997. 5 アカシュモクザメ. 瀬戸内海水産開発協議会編. 瀬戸内海のさかな. p.10, 神戸.
- ・平松 亘. 1985. 宇和海産魚類目録. 南予生物1 (1) : 10-18.
- ・吉野哲夫・青沼佳方. 1993. シュモクザメ科. 中坊徹次編. 日本産魚類検索図鑑-全種の同定-. p.110. 東海大学出版会. 東京.

（みずのこうき：愛媛県立宇和島水産高等学校

〒798-0068 宇和島市明倫町1-39・こやのたいち：愛媛県立宇和島水産高等学校3年）




写真 アカシュモクザメ(上から NSMT-P 55062,859.0mmTL,♂ ; 55063,896.0mmTL,♀ ; 55064,914.0mmTL,♂).