

高知県柏島周辺海域で得られたタキベラ成魚

高木基裕¹・鈴木貴明²¹ 愛媛大学南予水産研究センター ² 愛媛県釣り団体協議会写真1 *Bodianus perditio* タキベラ

種の記録

Labridae ベラ科

Bodianus perditio (Quoi and Gaimard, 1834)

タキベラ(写真1)

標本 採集年月日:2024年12月1日. 採集場所:高知県大月町 蒲葵島南東 赤バエ(32.7434527N, 132.6047308E). 採集方法:釣り. 水深約15m. 1個体. 全長55cm.

種の特徴

採集個体は吻が尖らないこと, 尾鰭が湾入形であること, 背鰭棘条部前半上縁は黒色であること, 体側後背部の黒色域は尾柄部まで広がらないこと, 胸鰭基部および臀鰭に黒色斑がないこと, 胸鰭先端部は黒色であることなどの特徴が島田(2013)のタキベラと一致したため, 本種と同定した. 個体は色彩や体サイズから成魚と考えられる(西山, 2012). なお, 標本は撮影, 全長測定後処分し, 現存しない.

備考

本種は伊豆諸島, 小笠原諸島, 硫黄島, 静岡県土肥, 和歌山県南部, 高知県, 屋久島, 琉球列島, 南大東島; 台湾, 南沙諸島, 南アフリカナタール〜モーリシャス(南半球), オーストラリア東岸〜バヌアツ, ツアモツ諸島の岩礁・サンゴ礁域に分布する, 最大80cmに達する

大型種である(島田, 2013). 四国西南海域でのタキベラの記録としては, 全長2〜8cmの幼魚が確認されているのみであり(平田ほか, 1996; 高木ほか, 2010), 本報告が採集, 撮影個体に基づく成魚の初記録となる.

引用文献

- 平田智法・山川 武・岩田明久・真鍋三郎・平松 亘・大西信弘. 1996. 高知県柏島の魚類相. 高知大学海洋生物教育研究センター研究報告. (16):1-177.
- 西山一彦. 2012. 日本のベラ大図鑑. 東方出版, 大阪. 26-27.
- 島田和彦. 2013. ベラ科. 中坊徹次(編). 日本産魚類検索全種の同定 第三版. 東海大学出版会, 東京. 1093-1094.
- 高木基裕・平田智法・平田しおり・中田 親. 2010. えひめ愛南お魚図鑑. 創風社出版, 松山. 88.

(2025年1月7日受付, 2025年1月13日公開)

連絡先: 高木基裕 (e-mail: takagi.motohiro.mc@ehime-u.ac.jp)

(Motohiro Takagi and Takaaki Suzuki. 2025. Record of *Bodianus perditio* (Labridae) adult from around Kashiwajima, Kochi Prefecture. NS Fieldnote, 25001)